

Modo de empleo



- Luego de lavar el cabello con el shampoo habitual, enjuagar y secar con toalla. Colocar la loción impregnando el cabello y el cuero cabelludo en toda su superficie.



- Dejar actuar durante diez minutos.



- Enjuagar con abundante agua hasta eliminar toda la loción. Es recomendable la aplicación de una crema de enjuague para facilitar la remoción de piojos y liendres.



- Peinar con un peine fino para remover de este modo piojos y liendres.

Una sola aplicación suele ser efectiva. Sin embargo, si se observan piojos o liendres puede volver a repetirse el tratamiento a la semana o a los 14 días.

nopucid
d-Fenotrin **mc**
(Sumithrin)*

Esp. Med. aut. por el Ministerio de Salud
Certificado N° 48.866
Interbelle Cosmetics S. A.
Rómulo Foncueva esq. Ramón Barbeito,
Parque Industrial Norte, San Luis.
Provincia de San Luis.
Dir. Téc.: Mauricio Filippa, Farmacéutico.
53690-00 20-mp-i

nopucid
d-Fenotrin **mc**
(Sumithrin)*



**NO EMPLEAR EN NIÑOS
MENORES DE 2 AÑOS**

120 ml

LOCIÓN

nopucid
d-Fenotrin **mc**
(Sumithrin)*

120 ml LOCIÓN

Sumithrin es la marca de Sumitomo Chemical Co., Ltd.

Industria Argentina - Venta Libre

Fórmula:

Cada 100 ml contiene: d-Fenotrin (Sumithrin) 0,3 g.
Excipientes: glicerina; dietanolamida de ácidos grasos de coco; cloruro de cetiltrimetilamonio; esencia floral; alcohol etílico; alcohol laurílico; color FD y C azul N° 1; agua purificada c.s.

Indicaciones:

NOPUCID MC es un ectoparasitida de uso externo para el tratamiento de la pediculosis del cuero cabelludo.

Reacciones adversas:

Prurito, enrojecimiento o edema del cuero cabelludo. Dificultad respiratoria o crisis asmática en personas predispuestas.

Precauciones y advertencias:

Este medicamento es de uso externo exclusivo. Si se presenta irritación cutánea y/o infección del cuero cabelludo, consultar al médico. No utilizar cerca de los ojos o mucosas. Si se produce contacto con los ojos, lavar con abundante agua. Es recomendable no realizar el tratamiento en lugares muy cerrados o poco aireados.

NO UTILIZAR COMO PREVENTIVO, PARA TRATAMIENTOS REPETIDOS CONSULTAR A SU MEDICO.

Contraindicaciones:

No emplear este medicamento en: menores de 2 (dos) años de edad, mujeres embarazadas o que se encuentren amamantando, ni en pacientes hipersensibles (alérgicos), a cualquiera de los componentes de la fórmula.

Presentación:

Envase conteniendo 120 ml.

Información para el paciente:

NOPUCID MC actúa contra piojos y liendres más expuestas. La materia prima de NOPUCID MC es importada de Japón.

MANTENER ESTE Y TODOS LOS MEDICAMENTOS FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. ANTE LA MENOR DUDA CONSULTE A SU MÉDICO Y/O FARMACÉUTICO.

Recomendaciones generales:

Todas las prendas en contacto con el paciente deben ser lavadas con agua caliente o en lavarropas durante 20 minutos. Aquellas prendas que no puedan ser lavadas deben dejarse en bolsa de plástico cerrada durante 2 (dos) semanas. Los peines y cepillos deben ser desinfectados en agua hirviendo durante por lo menos 5 (cinco) minutos debido a que ninguna piretrina es totalmente ovicida (no actúa sobre todas las liendres sino sólo sobre las más expuestas), y a pesar de la actividad residual de las mismas es necesario remover las liendres mecánicamente con un peine fino y en ocasiones repetir el tratamiento a los 7 (siete) o 14 (catorce) días del primero. No debe emplearse este producto como cosmético ni en forma preventiva ya que la acción del medicamento se produce sobre piojos y liendres más expuestas.

El grupo de convivencia del paciente debe ser evaluado ya que es más efectivo el tratamiento cuando se realiza simultáneamente en todas las personas afectadas o infestadas por la pediculosis.

Este medicamento es de uso externo exclusivo. Ante la ingestión accidental se recomienda consultar con un centro toxicológico:
Htal. de Niños Ricardo Gutiérrez: Tel. (011) 4962-6666
Htal. Posadas: Tel. (011) 4658-7777
Ctro. Nacional de Intoxicaciones: Tel 0800-3330160

Almacenar preferentemente entre 15 y 30 °C, en envase bien cerrado.